

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1236
van **BERT MAERTENS**
datum: 20 juni 2018

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Reuzenberenklauw - Bestrijding langs gewestwegen

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 166 van 18 oktober 2016 gaf de minister een overzicht van de locaties langs gewestwegen waar reuzenberenklauw voorkomt.

Ter opvolging graag de volgende vragen.

1. Werd deze inventarisatie sindsdien nog geactualiseerd? Zo ja, kan de minister de recentste versie hiervan ter beschikking stellen?
2. Kan de minister een overzicht geven van de locaties langs gewestwegen waar sinds oktober 2016 reuzenberenklauw (specifiek) bestreden werd? Graag een overzicht met opgave van locatie, tijdstip, methode en evaluatie van de bestrijding.
3. Welke evolutie inzake de verspreiding van reuzenberenklauw langs gewestwegen (periode 2016-2018) is er vast te stellen?

ANTWOORD

op vraag nr. 1236 van 20 juni 2018

van **BERT MAERTENS**

1. De inventaris wordt steeds i.f.v. nieuwe waarnemingen geactualiseerd. De meest actuele versie is in bijlage beschikbaar.
2. Voor alle locaties waar de aanwezigheid van de reuzenberenklauw wordt vastgesteld (zie oplijsting vraag 1) wordt de bestrijding toegepast.

De wijze van bestrijding (tijdstip, methodiek en evaluatie) gebeurt op een uniform afgesproken wijze en conform de richtlijnen vanuit het INBO/ANB:

- manueel verwijderen van de plant bij kleine haarden (minder dan 50 planten):
 - uitspitten tot op een diepte van 30 cm, best vóórleer ze in bloei komen. Het beste tijdstip hiervoor is april – mei.
 - twee weken later opnieuw controleren op nieuwe scheuten en bij nieuwe scheuten uitspitten herhalen
 - vervolgens een jaarlijkse controle in april gedurende 7 jaar. Indien nieuwe scheuten aanwezig zijn, dient het uitspitten herhaald te worden.
 - machinaal verwijderen van de plant bij grote haarden (meer dan 50 planten):
 - Maaien, minimaal drie keer per groeiseizoen:
 - i. De eerste keer eind april/begin mei (plaatselijk maaien);
 - ii. Een tweede keer bij de 1ste algemene maaibeurt (vanaf 15 juni);
 - iii. Een derde keer bij de tweede algemene maaibeurt (vanaf 15 september).
 - Drie weken na de eerste maaibeurt is er een controle op noodbloei (reactie van de plant om snel opnieuw te bloeien door het maaien). Indien dit het geval is, wordt onmiddellijk een extra maaibeurt uitgevoerd zodat de eventuele noodbloei in de kiem gesmoord wordt.
 - Vervolgens een jaarlijkse controle in april gedurende 7 jaar. Indien nieuwe scheuten aanwezig zijn, dient opnieuw éénmalig gemaaid te worden vóór de plant begint te bloeien
 - Bij het maaien en uitsteken van de plant worden de nodige voorzorgen genomen zodat arbeiders niet in contact komen met het plantensap. Het dragen van waterdichte beschermende kledij, stevige handschoenen en een beschermende bril is noodzakelijk.
3. Door de verhoogde aandacht voor de inventarisatie van de reuzenberenklauw is er een toename in het aantal geïnventariseerde locaties.
Doordat - zoals vermeld in het antwoord op deelvraag 2 - de bestrijding een opvolging van 7 jaar vereist, kan momenteel nog geen uitsluitel gegeven worden of de plant al definitief verdwenen is op de locaties waar bestrijding heeft plaatsgevonden. Wel wordt vastgesteld dat het voorkomen van nieuwe scheuten na het eerste bestrijdingsjaar geen eenduidig karakter vertoont.

BIJLAGE

Inventaris