

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 523
van **GRIET COPPÉ**
datum: 30 mei 2018

aan **JO VANDEURZEN**
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Hepatitis C - Preventie en sensibilisering

Het hepatitis C-virus (HCV) wordt overgedragen door rechtstreeks contact met besmet bloed. 20% van de geïnfecteerden geneest spontaan. 80% van de geïnfecteerden ontwikkelt een chronische hepatitis C, waarvan ongeveer 20% op lange termijn levercirrose ontwikkelt. Een chronische hepatitis C verhoogt bovendien de kans op leverkanker. De ziekte ontwikkelt zich gestaag, maar HCV-patiënten ervaren soms ook andere symptomen die de levenskwaliteit drukken, zoals fysieke en emotionele vermoeidheid, gewrichtspijn en angststoornissen.

Op vandaag zijn er in België vermoedelijk 70.000 personen besmet met HCV. Eén op de twee dragers van HCV weet niet dat hij of zij geïnfecteerd is. Nochtans is het virus via een eenvoudige bloedanalyse, bv. bij een jaarlijkse bloedcontrole bij de huisarts, op te sporen. Ook een sneltest bij risico-groepen kan uitsluitel geven. Risicogroepen voor HCV-besmetting zijn o.a.: de babyboom-generatie, medisch personeel, personen die drugs gebruiken of gebruikt hebben, personen die tatoeages of piercings lieten zetten of acupunctuur ondergingen in niet-steriele omstandigheden. In oktober 2017 organiseerden de ZNA-ziekenhuizen een 'screeningsweek hepatitis C' onder begeleiding van dr. Bourgeois. Gedurende 1 week konden bezoekers en zorgpersoneel zich via een sneltest laten screenen op HCV. Op 1.000 personen bleken 7 personen HCV-positief.

Ik verwijs naar een aanbeveling van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) uit 2012. Het KCE beveelt een algemene opsporing van het virus niet aan, maar het testen van de risicogroepen kan wel overwogen worden. Om gebruikers van intraveneuze drugs met succes te testen en te behandelen, is er een goede ondersteuning op sociaal en psychologisch vlak nodig. Deze ondersteuning moet voldoende flexibel en mobiel zijn.

Er bestaat geen vaccin tegen hepatitis C, maar door vroegtijdige detectie en sensibilisering kan de verspreiding van hepatitis C gestopt worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) streeft de doelstelling na om HCV tegen 2030 volledig te elimineren. Uit een evaluatie van het Belgische actieplan door de Boston Consulting Group, i.o.v. de WHO, blijkt België echter achterop hinkt, en blijkt dat eliminatie van de ziekte niet haalbaar is gelet op het huidige beleid. België staat in deze ranglijst tussen landen als Burundi, India, Mexico. In de kopgroep staan buurlanden Frankrijk en Nederland.

1. Kan de minister het Vlaamse preventiebeleid ten aanzien van hepatitis C toelichten?

2. Een sensibiliseringsactie rond HCV kan mensen informeren over de ziekte en aansporen om bij een bloedtest bij de huisarts zich te laten testen op HCV.

Hoe staat de minister tegenover dergelijke sensibiliseringsacties?

3. Zijn er vanuit Vlaanderen specifieke initiatieven inzake preventie, sensibilisering en screening (bijvoorbeeld via sneltests) ten aanzien van risicogroepen of staan dergelijke initiatieven op de planning?

ANTWOORD

op vraag nr. 523 van 30 mei 2018

van **GRIET COPPÉ**

Vooraleer in te gaan op uw concrete vragen, zou ik toch willen aanstippen dat het KCE-rapport waar u naar verwijst, in tegenstelling tot uw vraag, in haar aanbevelingen de babyboom-generatie niet als risicogroep voor HCV-besmetting benoemt. De babyboom-generatie, klassiek zijn dat de mensen geboren tussen circa 1945 en 1955, zijn ruwweg 630.000 mensen. De groep is erg heterogeen en screening op basis van geboortedatum lijkt ook ons nu alvast niet aangewezen.

1+3. Momenteel zijn er drie acties in verband met de preventie van hepatitis C.

- Binnen de Technische Werkgroep bij het Preventieprotocol wordt in het kader van het nationale hepatitis C-plan van 2014, getracht om een samenwerking op gang te trekken tussen de federale overheid en de verschillende gemeenschappen.
- Het Vlaamse spuitenruilprogramma richt zich op het voorkomen van verspreiding van besmettelijke ziekten zoals hepatitis C. Het beoogt ook het voorkomen van verspreiding naar andere bevolkingsgroepen door bv. injectienaalden te recupereren.
- Sensoa, de Vlaamse partnerorganisatie voor seksuele gezondheid, sensibiliseert rond HCV bij MSM (mannen die seks hebben met mannen) en dit zowel bij personen mét als zonder HIV. De specifieke subsite geeft de raad om "je regelmatig op hepatitis C te laten testen indien je hiv hebt, aan groepsseks doet, zonder condoom neukt, zonder handschoenen fist, speeltjes deelt, drugs gebruikt.."

Ook de jongerensite van Sensoa informeert over hepatitis C.

- Het C-Buddyproject, waarin in uw vraag 524 dieper op ingegaan wordt, werkt rond HCV bij (ex-) druggebruikers.

2. Een sensibiliseringsactie voor de algemene bevolking rond hepatitis C is niet gepland. Een dergelijke actie leunt minstens aan bij screening van de algemene bevolking, een actie die niet aanbevolen wordt door het KCE-rapport over hepatitis C. Wel plannen we om de zorgverstrekkers meer te informeren over hepatitis C.