

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 539
van **ELKE SLEURS**
datum: 6 juni 2018

aan **JO VANDEURZEN**
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vaccinatiebeleid - Meningokokken type W

Hersenvliesontsteking en meer bepaald de meningokokbacterie type W is bij onze noorderburen aan een opmars bezig. Deze bacterie verspreidt zich heel snel en zorgt voor misselijkheid, diarree, plotse hoge koorts, vlekken of een stijve nek. Binnen 24 uur kan een patiënt overlijden. De mortaliteit is hoog (15%) in Nederland en vooral pubers geraken besmet.

Op de website van Zorg en Gezondheid zien we een stijging van het aantal meldingen van meningokokken invasieve infecties. In het eerste kwartaal van 2018 werden al 29 gevallen gemeld (ten opzichte van 60 in het hele jaar 2017). Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen de types hersenvliesontsteking.

In Vlaanderen wordt enkel de vaccinatie tegen meningokokken type C aangeraden. Ze is niet verplicht. De Hoge Gezondheidsraad gaf voor een systematische vaccinatie tegen type B een negatief advies in 2017. Over type W is er geen advies.

De Vlaamse overheid heeft in 2016 een studie uitgevoerd over de vaccinatiegraad in Vlaanderen. Een van de bevindingen van de studie is dat de vaccinatiegraad bij baby's hoog blijft. Bij jonge kinderen is er nog verbetering mogelijk, zeker als de vaccinaties buiten Kind en Gezin gebeuren.

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal meldingen van meningokokken per type, per geslacht en per leeftijdsgroep (baby's, jonge kinderen en adolescenten) voor de voorbije vijf jaar? Heeft de minister zicht op het aantal overlijdens, globaal, per type, per geslacht en per leeftijdsgroep?
2. Is het opportuun om aan de Hoge Gezondheidsraad advies te vragen over de meningokokbacterie type W? Zo neen, waarom niet?
3. Hoe gaat de Vlaamse Vaccinatiekoepel om met de recente evoluties inzake infectie door de meningokokbacterie type W? Welke opvolging gebeurt er om tijdig in eventuele wenselijke aanpassingen binnen het Vlaams Actieplan Vaccinaties 2012-2020 te voorzien?

ANTWOORD

op vraag nr. 539 van 6 juni 2018

van **ELKE SLEURS**

1. Voor de jaren 2013 tot en met 2017 vindt u in tabel 1 de gegevens van waarschijnlijke en bevestigde gevallen van invasieve meningokokkeninfecties. De serogroep kon niet altijd bepaald worden.

Tabel 2 geeft voor dezelfde categorieën het aantal gekende overlijdens.

2. Binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid wordt de evolutie van de epidemiologie van de meningokokkeninfecties van nabij opgevolgd.

Hetzelfde gebeurt door de Hoge Gezondheidsraad binnen de werkgroep vaccinaties. Dit gebeurt in functie van een eventuele aanpassing van het advies in verband met vaccinatie tegen meningokokken van serogroep C. Er wordt immers een toename waargenomen zowel van serogroep W135 als van serogroep Y. Ook in 2018 zet deze opgemerkte toename zich verder, zij het momenteel nog niet in dezelfde grootteorde als begin 2000 gezien werd voor meningokokken C.

3. Ook de Vlaamse Vaccinatiekoepel volgt de epidemiologie verder op. De koepel is in de eerste plaats een stakeholdersgroep voor de ondersteuning en begeleiding van implementatie van beleidsmaatregelen. Wat betreft meningokokken gebeurt de opvolging dan ook vooral in functie van een eventueel advies voor de implementatie van een mogelijke aanpassing van het vaccinatiebeleid.

Tabel 1: aantal gemelde gevallen van meningokokkeninfecties per jaar, geslacht, serogroep en leeftijdscategorie

jaar	categorie	mannelijk					vrouwelijk						totaal
		B	C	W13 5	Y	?	B	C	W135	X	Y	?	
2013	<1	6					2						8
	1-4	7					9					2	18
	5-9	1	1		1	1	2						6
	10-14												0
	15-19	2				2	3						7
	20-24	5				1	3						9
	25+	5	1		1	1	6	3	1		2	2	22
	totaal	26	2		2	5	25	3	1		2	4	70
2014	<1	1				1	1					1	4
	1-4	2				2	4	1				1	10
	5-9	1				2	3						6
	10-14	1				1						3	5
	15-19	2			1	2	5					1	11
	20-24					1							1
	25+	1				1	4	1	1		5	4	17
	totaal	8			1	10	17	2	1		5	10	54
2015	<1	2				3	1		1				7
	1-4	1				1	4					1	7
	5-9	2										1	3
	10-14	1				1	2						4
	15-19	3	1		1	2	2					1	10
	20-24	1	1	1			1				1		5
	25+	2	1			4	9	1			3	3	23
	totaal	12	3	1	1	11	19	1	1		4	6	59
2016	<1	1					2				1	1	5
	1-4	5		1		4							10
	5-9						1					1	2
	10-14	1					2					1	4
	15-19	2			3		3			1		2	11
	20-24	2	1				1						4
	25+	3	2		3	2	3	1			5	4	23
	totaal	14	3	1	6	6	12	1		1	6	9	59
2017	<1	2			2	1	1					2	8
	1-4	3					2					1	6
	5-9	1			1	2	1				1		6
	10-14	1					2						3
	15-19	2		1	3	1	5				1	1	14
	20-24	1		1			1						3
	25+	6	4	1	2		6				1		20
	totaal	16	4	3	8	4	18				3	4	60

Tabel 2: aantal gekende overlijdens aan meningokokkeninfecties per jaar, geslacht, serogroep en leeftijdscategorie

jaar	categorie	mannelijk					vrouwelijk				totaal
		B	C	W135	Y	?	B	C	Y	?	
2013	<1						1				1
	1-4						1				1
	25+	1			1			2			4
	totaal	1			1		2	2			6
2014	15-19				1						1
	25+								1	1	2
	totaal				1				1	1	3
2015	15-19	1									1
	25+		1						1		2
	totaal	1	1						1		3
2016	25+	1									1
	totaal	1									1
2017	<1					1					1
	10-14	1									1
	15-19						1				1
	20-24			1							1
	25+	1			2				1		4
	totaal	2		1	2	1	1		1		8