

Tabel 4: Effectieve vangst per soort en per staalnameplaats op de locaties bemonsterd op de Bovenschelde in 2014 uitgedrukt in CPUE (elektrisch in G/100 m en N/100 m, fuiken in G/fuikdag en N/fuikdag met G = gewicht in g en N = aantal)

Nummer		tiendoornige stekelbaars	driedoornige stekelbaars	alver	baars	bittervoorn	blankvoorn	blauwbandgrondel	brasem	donderpad	hybride	karper	kolblei	paling	pos	riviergrondel	serpeling	snoek	snoekbaars	winde	Totaal
44000100	G/100m				51,8		0,2							125,5							177,5
elektrisch	N/100m				3,2		0,2							0,6							4
44000100	G/fuikda				238,6		312,5	2,2	328,2				374	345,2	13,3	6,2			164,3		1784,5
fuiken	N/fuikda				2,5		6,5	0,2	0,2				2	2	1	0,5			0,5		15,4
45200150	G/100m		0,3		1,1									277,1							278,5
elektrisch	N/100m		0,2		0,2									1,2							1,6
45200150	G/fuikda				9,8		35,4							1180	16,2				206,2		1447,6
fuiken	N/fuikda				0,8		0,8							3,5	0,2				0,2		5,5
45200600	G/100m			1,1	1,9							2,9		1036,5	2,8						1045,2
elektrisch	N/100m			0,2	0,2							0,2		6,6	0,2						7,4
45200600	G/fuikda				16,9									1818,9					48,5		1884,3
fuiken	N/fuikda				1									7					0,2		8,2