

Bijlage 3. Effectieve vangst per soort en per staalname in 2016 uitgedrukt in CPUE (elektrisch in G/100m en N/100m; fuiken in g/fuikdag en N/fuikdag met G=gewicht in g en N=aantal)

Nummer		Amerikaanse hondsvi	baars	bermpje	blankvoorn	blauwbandgrondel	driedoornige stekelbaars	kopvoorn	marmergrondel	paling	rietvoorn	riviergrondel	serpeling	snoek	tiendoornige stekelbaars	Totaal
93530117	G/100m						32,4								37,9	70,3
elektrisch	N/100m						43								58	101
93530260	G/100m		872	48	672,5	0,7	17,2	8138,7		1907,4		524,8	210,9	1560	2,1	13954,3
elektrisch	N/100m		12	11	13	1	16	17		2		184	4	2	3	265
93530475	G/100m			41,9			105,4	420,1			7,4				3,9	578,6
elektrisch	N/100m			5,0			67,0	1,8			0,9				3,7	78,4
93530475	G/fuikdag	2,17	4,32	141,0	7,0		13,9	96	6,0			147,1	19,1			436,7
fuiken	N/fuikdag	0,25	0,25	15	0,25		6	0,25	1			6,25	0,25			29,5