

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 224

van **CELIA GROOTHEDDE**

datum: 11 januari 2022

aan **WOUTER BEKE**

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Endometriose - Diagnose en sensibilisering

Wereldwijd duurt het gemiddeld 8 jaar voordat vrouwen de diagnose van endometriose krijgen. Nochtans krijgt ongeveer 1 op de 10 vrouwen met deze ziekte te maken.

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal vrouwen die de diagnose kregen per jaar voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021?
2. Wat is de gemiddelde leeftijd dat vrouwen in Brussel en Vlaanderen de diagnose van endometriose krijgen?
3. Welke initiatieven neemt de minister om de diagnose van endometriose te versnellen en vergemakkelijken?
4. Welke preventie- en sensibiliseringscampagnes onderneemt de minister en plant hij nog om de kennis over endometriose te vergroten bij zowel artsen, hulpverleners als patiënten?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 224 van 11 januari 2022

van **CELIA GROOTHEDDE**

1. Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de INTEG0-databank, gevoed vanuit de gegevens van geselecteerde huisartsenpraktijken.

Onderstaande gegevens tonen zowel de incidentie (aantal nieuwe gevallen in de populatie) als prevalentie (voorkomen van de aandoeningen in de populatie).

JCG	incidence_number	incidence_total	inc_N80
2017	36	54104	0.06653852
2018	103	128213	0.08033507
2019	88	133776	0.06578161
2020	110	139861	0.07864952
2021	82	91550	0.08956854

JCG	prevalence_number	prevalence_total	prev_N80
2017	496	54104	0.9167529
2018	983	128213	0.7666929
2019	1064	133776	0.7953594
2020	1134	139861	0.8108050
2021	968	91550	1.0573457

2. Uit diezelfde databank geeft een gemiddelde leeftijd voor de incidentie aan van 36,63j in 2017 en van 34,87j in 2021. Een uitsplitsing maken voor Brussel of Vlaanderen is niet mogelijk.
- 3-4. worden samen beantwoord. De organisatie van de opleiding om zorgaanbieders bij te scholen en te sensibiliseren omtrent deze aandoening is een onderwijskundige aangelegenheid. Hoewel endometriose een aandoening is die voor de betrokken patiënten een grote impact kan hebben op de levenskwaliteit, is er geen specifiek preventie- of sensibiliseringsprogramma dat kan worden opgezet, zonder ongewenste nevenschade te veroorzaken m.a.w. de aandoening voldoet immers niet aan de voornaamste criteria van Junger en Wilson inzake preventie: de op te sporen ziekte moet een belangrijk gezondheidsprobleem zijn en gemakkelijk en eenvoudig op te sporen zijn om dan te kunnen behandelen.