

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 385

van **IMMANUEL DE REUSE**

datum: 16 februari 2022

aan **WOUTER BEKE**

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Coronavaccins - Verkeerde toediening aan kinderen

De coronavaccinatie voor jonge kinderen (5-11 jaar) is volop bezig. Momenteel is enkel het Pfizer-vaccin goedgekeurd om te gebruiken bij jonge kinderen. Het is de bedoeling dat jonge kinderen maar een halve dosis van dit vaccin ontvangen. Helaas zagen we de laatste dagen in het nieuws dat er toch enkele verkeerde vaccins zijn toegediend.

Recentelijk werden 21 jonge kinderen in Kampenhout verkeerdelijk ingeënt met het Moderna-vaccin (halve dosis). Een aantal kinderen zagen nadien hun gezondheid achteruit gaan en hadden last van hoge koorts. Pas twee dagen later kregen de ouders telefoon van het vaccinatiecentrum om hen op de hoogte te brengen van de fout die er was gebeurd. De burgemeester van Kampenhout noemt dit een 'menselijke fout'. De ouders van de kinderen denken daar echter anders over en maken zich zorgen om de gezondheid van hun kind. Het Agentschap Zorg en Gezondheid nam ondertussen contact op met onder andere viroloog Pierre Van Damme. "Hoewel er nog niet veel gegevens beschikbaar zijn, is de inschatting dat er geen gezondheidsrisico zal zijn voor de kinderen", zegt woordvoerder Joris Moonens. Daarnaast werd er gevraagd aan de mensen om de situatie de komende tijd wel goed op te volgen en mogelijke bijwerkingen te melden. Momenteel zou het ook niet duidelijk zijn waar het is misgelopen.

Het incident in Kampenhout is echter geen alleenstaand geval. Zo hebben in Gent twee 12-jarigen ook een Moderna-vaccin gekregen in plaats van Pfizer. Naast het toedienen van een verkeerd vaccin, kan het ook voorvallen dat er een verkeerde dosis wordt toegediend. In Kortenberg werd er zo een halve dosis toegediend aan enkele 12-jarigen terwijl ze een hele dosis zouden moeten ontvangen. Daarnaast kreeg een kind ook een hele dosis in plaats van een halve dosis.

1. Hoe zullen de kinderen die een verkeerd vaccin toegediend kregen medisch opgevolgd worden om tijdig in te grijpen bij mogelijke gevolgen? Zal er periodiek een controle plaatsvinden?
2. Welke bijwerkingen zijn er momenteel al gemeld door de ouders van kinderen die een verkeerd vaccin kregen?
3. Wordt elk geval van het verkeerd toedienen van een vaccin gemeld? Heeft de minister zicht op het aantal gevallen van het verkeerd toedienen van een vaccin bij (jonge) kinderen?
4. Wat is de visie van de minister op dergelijke incidenten? Welke initiatieven neemt de minister om ervoor te zorgen dat zulke incidenten niet meer zullen voorkomen? Kunnen kleine veranderingen in de organisatie van de vaccinatiecentra zulke fouten vermijden?

ANTWOORD

op vraag nr. 385 van 16 februari 2022

van **IMMANUEL DE REUSE**

Laat me toch eerst benadrukken dat de vaccinatiecentra zeer zorgvuldig te werk gaan bij het toedienen van de vaccins. Zij hebben intussen honderdduizenden vaccinaties gedaan. Daarbij zijn er een aantal fouten gemaakt. Uiteraard is iedere fout er één te veel, maar het blijft toch ook belangrijk om deze gevallen in de juiste context te plaatsen. Een nulrisico bestaat jammer genoeg niet.

Tot nu toe zijn er bij mijn weten gelukkig geen ernstige nevenwerkingen opgetreden bij deze kinderen.

U stelt in uw vraag dat voor jonge kinderen een halve dosis van een vaccin van Pfizer zou toegediend zijn, maar dit is niet correct. Het pediatrisch vaccin van Pfizer bevat één derde van de dosis voor volwassenen. De meeste incidenten die gemeld worden, gaan om kinderen die net 12 jaar geworden zijn, vaak bij uitnodiging nog 11 waren en die een pediatrische dosis gekregen hebben in plaats van een dosis voor volwassenen.

Momenteel wordt een halve dosis van het vaccin van Moderna vaak gebruikt voor de booster dosis voor volwassenen. Ondertussen heeft het Europees geneesmiddelenagentschap op 24 januari een positief advies gegeven voor het gebruik om diezelfde dosering, namelijk een halve dosis van het vaccin van Moderna en dus de dosering waar u naar verwijst, voor vaccinatie van kinderen tussen 6 en 12 jaar.

1. Voor sommige fouten is het belangrijk om de zaken van dichtbij op te volgen. Ouders worden hiervan normaal gezien verwittigd. Bij andere fouten, bv. een te lage dosis, is er geen onmiddellijke impact, behalve dat de immuniteit mogelijk trager en in mindere mate opgebouwd wordt. In zowat alle gevallen volstaat het dat de huisarts van het kind de opvolging op zich neemt. Het is immers de huisarts die de gezondheidstoestand en -geschiedenis van het kind het beste kent. Mochten er door de huisarts ernstige nevenwerkingen vastgesteld worden, dan meldt hij dit volgens de geëigende wegen aan het vaccinatiecentrum en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
2. Op dit moment hebben we geen weet van ernstige bijwerkingen na foute toediening, gemeld aan Zorg en Gezondheid, bij kinderen die om een of andere reden geen pediatrisch vaccin gekregen hebben. De meest courante nevenwerkingen zoals koorts, moeheid, algemene malaise enz. worden wel gemeld, maar in dezelfde mate als we zien bij kinderen die gevaccineerd werden met een pediatrisch vaccin van Pfizer.
3. De vaccinatiecentra moeten alle verkeerde toedieningen van de vaccins melden aan Zorg en Gezondheid. Op die manier kan men zicht houden op het aantal verkeerd toegediende vaccins zowel bij volwassenen als bij kinderen; die blijven duidelijk een zeer kleine minderheid uitmaken van de toegediende vaccins.
4. We moeten uiteraard maximaal trachten te vermijden dat een verkeerd vaccin of verkeerde dosis toegediend wordt. De vaccinatiecentra werken daarom volgens standaarden, die indien nodig ook bijgesteld worden. Maar het valt jammer genoeg nooit uit te sluiten dat er heel sporadisch een fout gebeurt.

In de vaccinatiecentra wordt gewerkt met het vier-ogenprincipe. Daarbij controleren verschillende personen de identiteit en leeftijd van de te vaccineren persoon. Ook wordt het vier-ogenprincipe toegepast voor het klaarmaken van de vaccins. Daarnaast werd er aan de vaccinatiecentra gevraagd om minstens een aparte lijn voor de kindervaccinatie te openen of, nog beter, een apart vaccinatiemoment te voorzien voor kinderen.

Bij een melding van een incident wordt altijd samen met het vaccinatiecentrum nagekeken hoe deze fout is kunnen gebeuren en hoe deze in de toekomst vermeden kan worden.