

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 856

van **FREYA SAEYS**

datum: 22 september 2022

aan **HILDE CREVITS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Gebruik PrEP - Toename van soa's en schurft

Sinds mannen die seks hebben met mannen (MSM) PrEP ter beschikking hebben, lopen ze een beduidend lager risico op hiv-besmetting. Maar het gebruik van PrEP heeft bij een aantal onder hen blijkbaar geleid tot minder condoomgebruik. Dat verhoogt dan weer het risico om een seksueel overdraagbare aandoening (soa) op te lopen. Ook zou het aantal gevallen van schurft toenemen.

1. Beschikt de minister over indicaties dat het gebruik van PrEP een invloed heeft op condoomgebruik en het aantal vastgestelde soa's?
2. Is er inderdaad sprake van een toename van het aantal gevallen van schurft?
3. Zo ja, welke maatregelen neemt de minister om die verdere toename te voorkomen?
4. Situeert die toename van schurft zich hoofdzakelijk bij MSM (met wisselende contacten)?
5. Worden er initiatieven genomen om MSM met wisselende contacten te sensibiliseren om toch een condoom te gebruiken tijdens het seksueel verkeer, ook als ze PrEP gebruiken?



**Vlaams
Parlement**

HILDE CREVITS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 856 van 22 september 2022

van **FREYA SAEYS**

1. PrEP, Pre Exposure Profylaxis, is in België sinds 2017 beschikbaar voor een groep mensen die om uiteenlopende redenen geen of minder consistent condoomgebruik realiseren en zich met medicatie beschermen tegen een infectie met hiv. Minder condoomgebruik onder deze groep is dus, minstens deels, eerder een reden voor, dan een gevolg van, PrEP.

Meer soa onder PrEP-gebruikers is ook eerder verbonden met de voorwaarden voor PrEP, dan dat het een oorzaak-gevolg-relatie zou zijn. De voorwaarden voor het bekomen van PrEP zijn strikt, nl. een verhoogd risico op hiv door onbeschermd anale seks met meer dan 2 partners of infecties met soa's in het afgelopen jaar.

Deze voorwaarden zijn bepaald door het RIZIV. De redenering hierachter steunt op 2 principes. Enerzijds is dat het voorkomen van een hiv-infectie, anderzijds kunnen de soa's die door screening gevonden worden bij deze groep mensen, zo snel mogelijk worden behandeld en dit beperkt de infectiedruk en de druk op zowel het gezondheids-systeem als op de persoonlijke gezondheid van de betrokken doelgroep aangezien hiv-infecties vermeden worden. De RIZIV-conventie van de hiv-referentiecentra schrijft voor dat PrEP-gebruikers 3-maandelijks getest worden op 3 soa's (chlamydia, gonorroe en hepatitis C), wat een hogere frequentie is dan bij de rest van de bevolking en dus ook potentieel leidt tot een hogere detectie en aantallen.

Sciensano verzamelt voor België sinds 3 jaren surveillance-gegevens van PrEP-gebruikers bij de hiv-referentiecentra, waarvan de laatste 2 jaren ook gegevens over soa-diagnoses onder PrEP-gebruikers. Deze zijn momenteel onderling nog niet te vergelijken.

2. Voorlopig heeft Zorg en Gezondheid nog geen alomvattende data kunnen verzamelen. Er is namelijk enkel een meldingsplicht voor clusters van scabiës en niet van individuele cases. Wel wordt er veelvuldig melding gemaakt van een toename vanuit dermatologen, huisartsen etc., en ook Zorg en Gezondheid heeft de ervaring van een toenemende incidentie. Ook in andere Europese landen neemt men een stijging in incidentie waar. Zowel hier als internationaal wordt resistentie tegen permethrine, de voorkeursbehandeling bij scabiës, naar voor geschoven als mogelijke maar momenteel niet bewezen hypothese.
3. Er is een nieuw behandelingsadvies verspreid onder de huisartsen door Zorg en Gezondheid om de kans op recidief te doen dalen. Verder worden er diverse structurele pistes bewandeld zoals het betrekken van gemeenten in de bestrijding van scabiës naar het voorbeeld van de werking die reeds bestaat in Antwerpen.
4. Er zijn zeker geen aanwijzingen dat de MSM populatie verantwoordelijk is voor de vermoede stijging in het voorkomen van scabiës. De SOA kliniek van het ITG ziet in hun cijfers geen sterke toename over de laatste jaren. Ook krijgt Zorg en Gezondheid geen verontrustende signalen hierover vanuit de eerste lijn, noch hebben ze in deze gemeenschap extra clusters gedetecteerd.

5. Sensoa sensibiliseert mannen die seks hebben met mannen om na te denken of PrEP voor hen van toepassing is in hun seksuele gezondheid. Op events en festivals als Darklands e.a., wordt specifiek gesensibiliseerd over PrEP. Online biedt Sensoa informatie aan waarin verschillende rolmodellen getuigen over hun PrEP-gebruik en condoomgebruik: [PrEP | allesoverseks.be - van Sensoa.](#)

PrEP gebruiken betekent dat men zich intensief laat opvolgen door de PrEP-verstrekker. Tijdens deze contacten is er ruimte om rond preventie te counselen. Belangrijk daarbij is evenwel ook dat net het, om diverse redenen, minder vermijden van risicogedrag op infectie, een van de elementen is van het opstarten van PrEP. De bij deze personen ervaren moeilijkheden rond de principes van veilig vrijen is daar een element van.